

<b>Cliente:</b> Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio M. Torres Filho	
<b>Veículo:</b> Jornal Extra	<b>Data:</b> 29/10/2018
<b>Colunas/Editoria:</b> Bem Viver	<b>Página:</b> 25

INFORMAÇÃO extra.globo.com

# EXTRA

20 ANOS

PRIMEIRA EDIÇÃO  
RIO DE JANEIRO  
SEGUNDA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 2018  
ANO XXI  
NÚMERO 8.102

ISSN 2178-5147  
9 772178 514009

R\$ 1,50

Segunda-feira, 29 de outubro de 2018 [extra.globo.com](http://extra.globo.com) < 25

## Bem-viver

PREVINA-SE!

# Sífilis pode ser passada a bebês e levá-los à morte

Doença deve ser prevenida com o uso de preservativos em todas as relações sexuais

► O mau hábito de não usar preservativo nas relações sexuais provocou uma epidemia de sífilis no Brasil. De acordo com o boletim epidemiológico 2017 sobre a doença, foram registrados 87.593 casos de sífilis adquirida, 37.436 casos de sífilis em gestantes e 20.474 casos de sífilis congênita (quando a doença passa da mãe para o bebê), em 2016. O Rio lidera o ranking nacional nas taxas de mortes de menores de 1 ano de idade por causa de sífilis congênita (18,1 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos) e fica em 2º lugar nas taxas de sífilis congênita (11,8 casos em mil nascidos vivos).

<b>Cliente:</b> Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio M. Torres Filho	
<b>Veículo:</b> Jornal Extra	<b>Data:</b> 29/10/2018
<b>Colunas/Editoria:</b> Bem Viver	<b>Página:</b> 25

— Para evitar que a sífilis afete o bebê, o indicado é que as gestantes realizem um pré-natal adequado, que inclui três exames para sífilis: um no início da gestação, um no terceiro trimestre e outro logo antes do parto. Parceiros de grávidas e mulheres que estão tentando engravidar também devem realizar o exame— orienta Maria Elisa Noriler, ginecologista e obstetra.

A sífilis é uma doença infecciosa causada pela bactéria *Treponema pallidum* que pode ser transmitida em qualquer relação sexual sem proteção. Ela é classificada em quatro estágios, de acordo com o tempo de infecção: primária, secundária, latente e terciária. A forma congênita pode trazer graves problemas às crianças, principalmente quando não diagnosticada durante a gestação ou logo após o nascimento.

— Os perigos da sífilis congênita para o bebê são enormes, desde alterações que podem se apresentar mais precocemente, como nascimento prematuro, baixo peso ao nascer, lesões na pele e problemas respiratórios, até riscos numa forma mais tardia, como alte-

<b>Cliente:</b> Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio M. Torres Filho	
<b>Veículo:</b> Jornal Extra	<b>Data:</b> 29/10/2018
<b>Colunas/Editoria:</b> Bem Viver	<b>Página:</b> 25

rações de face e ósseas, surdez neurológica, déficit cognitivo, entre outros — alerta Guilherme Sargentelli, pediatra do Grupo Prontobaby.

## **Tratamento é simples e de curta duração**

▶ Tanto a sífilis adquirida quanto a congênita têm cura. O tratamento é feito com penicilina injetável e é rápido.

— As doses e duração do tratamento variam de acordo com o risco de infecção do bebê, sendo que o tratamento mais longo dura até 14 dias — afirma Helio Magarinos Torres Filho, diretor médico do Richet Medicina e Diagnóstico e membro da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica.

Procurada pelo EXTRA, a Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental da Secretaria estadual de Saúde informou que “diante do aumento do número de casos no estado, a secretaria (...) intensificou ações junto aos municípios. Entre as medidas,

<b>Cliente:</b> Richet Medicina & Diagnóstico – Dr. Helio M. Torres Filho	
<b>Veículo:</b> Jornal Extra	<b>Data:</b> 29/10/2018
<b>Colunas/Editoria:</b> Bem Viver	<b>Página:</b> 25

disponibiliza teste rápido gratuito para diagnóstico da doença em todas as cidades do Rio de Janeiro e, ainda, fornece, a partir de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, a penicilina benzatina, usada para tratar a doença” . ❖

## ▶ SAIBA IDENTIFICAR

Conheça os sintomas de cada fase da sífilis adquirida

### PRIMÁRIA

Úlcera (cancro duro), geralmente única, no local de entrada da bactéria (pênis, vulva, vagina, colo uterino, ânus, boca ou outros locais). Geralmente não dói, não coça, não arde e não tem pus. Podem surgir ínguas na virilha. A lesão aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Pode durar entre 2 e 6 semanas e desaparecer de forma espontânea, independentemente de tratamento

### SECUNDÁRIA

Manchas no corpo, principalmente na palma das mãos e planta dos pés, são as mais comuns, sendo, muitas vezes, confundidas com alergia ou outras doenças semelhantes. Surgem entre 6 semanas e 6 meses após aparecimento da úlcera inicial. Desaparecem de forma espontânea em poucas semanas, independentemente de tratamento, mesmo a pessoa ainda tendo a infecção

### LATENTE

Não aparecem sinais ou sintomas, sendo o diagnóstico realizado por testes imunológicos. É dividida em sífilis latente recente (menos de 2 anos de infecção) e sífilis latente tardia (mais de 2 anos de infecção). Apesar de assintomática, pode ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária

### TERCIÁRIA

Geralmente apresenta lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Pode surgir décadas após o início da infecção

Identificar os sinais da sífilis e iniciar o tratamento adequado evita a transmissão da doença para o bebê